

Ăn Cá Sông Có Nguy Hiểm Không?

Tác giả: Nguyễn Thành Chánh, DVM
Thứ 7/2013; Ngày 9 tháng 9 năm 2009 18:28

Gỏi cá sông là đặc sản của vùng duyên hải VN.



Món gỏi cá sông tuy rất ngon nhưng nó vẫn là một đe dọa đối với sức khỏe chúng ta. Cá sông có thể nhiễm khuẩn và nhiễm ký sinh trùng mà đáng kể nhất là giun đũi gai Gnathostoma. Loài giun này rất phổ biến tại vùng Đông Nam Á, Nam Mỹ, Mexico, Peru và Ecuador.

Dĩa gỏi cá sông có危害 không?

Viet Nam là một trong những quốc gia có tỷ lệ nhiễm giun đũi gai khá cao. Giun trống thành (adult) sống trong bao tử chó và mèo. Trứng giun theo phân nhiễm vào nước mặn chay xuống ao hồ sông rạch. Trứng non ra ấu trùng (larvae) và bò mạt loài giáp xác (crustacea) thốt nhốt có tên là cyclop ăn vào. Cá, lợn, rắn, ốc nhái, gà vịt, và các loài thủy corm (waterfowl) đón nhận nhiên liệu cyclop vào bụng và bò nhiễm giun đũi gai. Trong các loài vật vua kia, ấu trùng giun sẽ đính vào trong thịt.

Khi chúng ta dùng cá sông, ấu trùng vào bụng, xuyên ruột và đi tống trong cơ thể chúng ta. Giun có thể vào gan, vào mề, di chuyển dễ dàng, hoặc đính vào não hay trong tủy sống. Đây là bệnh Gnathostomosis.

Đi đến đâu, giun gây tình trạng viêm sưng đó. Tùy nơi giun đính vào mà triệu chứng sẽ khác nhau. Một số làm giảm sức khỏe mệt mỏi, và gây hen suyễn hô hấp. Nguy hiểm nhất là nếu giun đính vào trong hố thần kinh trung ương và gây chấn thương não tự (encephalomyelitis), làm rách lỗ nách corm giác, lật tạng và có thể chết. Không dễ gì chẩn đoán bò nh giun đũi gai. Nếu biết rõ nơi đính vào nó, thì có thể làm sinh thiết (biopsy) để xét nghiệm. Người ta cũng có thể chẩn đoán bò nh qua xét nghiệm huyết thanh hắc (test ELISA)... Vài năm trước đây Hải Dương Sỹ VN tại Hoa Kỳ cũng có đăng một bài nói về mề mệt ca nhiễm giun đũi gai ở một số Việt kiều lúc về thăm quê hương. Trong thời gian ở VN, anh ta có nhu cầu với bún bò

Ăn Cá Sông Có Nguy Hiểm Không?

Tác Giả: Nguyán Tháng Chánh, DVM
Thứ Ba, 08 Tháng 9 Năm 2009 18:28

món thịt rộn h将士 mang, và đặc biệt là anh ta xem sông nguyên tim rộn vui hy vọng là sẽ đặc cung sống sẽ bỗng 5 bộ ngay 10 ngày tháng.

Khi trộ qua Hoa Kỳ, anh ta bắt đầu ngã bệnh và có dấu hiệu mệt mỏi yếu sức lờ thèm thêm sốt, nổi mày đay ở chân, đau ở vùng gan, ăn luttonh vẫn chịu. Kết quả xét nghiệm máu, cho thấy số bạch cầu eosinophils trong máu tăng cao 13.000.

Các bác sĩ bên Mỹ mò mẫm chữa trị bằng kháng sinh, nhưng bệnh vẫn không thuyên giảm. Cuối cùng qua số điện thoại của một nhà ký sinh trùng học, bác sĩ Nagami, thuộc The Centers for Disease Control & Prevention (CDC), bệnh đã đặc biệt chính xác: bệnh nhân đã bị nhiễm giun đũa gai Gnathostoma spinigerum.

Thuốc Albenza (Albendazole) đã đặc số đông đũa trứ đặc biệt...

Kết Luận

Trứng hulp có đi du lịch VN, Thái Lan hoặc Nam Mỹ, đặc phòng ngừa giun đũa gai chúng ta chớ nên ăn thịt, cá, rộn, luttonh, ch vv...đã đặc nêu thết chín mà thôi. Đông luttonh có nhiễm đũa C diệt đặc giun Gnathostomas.

Tham khảo:

-Stanford univ. *Gnathostomiasis*