

Các vú đau đún hay búnh tút thông thường rút có thú là chúng cõ quan trúng... nhúng dõoi khi lúi cõc kú nghiêm trúng. Vì vúy chúng ta cõn phúi cõn thún cõn nhúc nhúng gúi phúi l&h;am mõi khi sú vúc xúy ra cho chúng ta

1- Khi thúy túc thú

Lý do: có thú là do nghún mõch phúi (pulmonary embolus)

Nhún xét: Cõm thúy khú thú sau khi túp thú dõc hay đang ngúi có thú là do vún đúng hay do hú lo l&h;ng. Nhúng núu đõt nhiên bú khú thú có thú là do chúng nghún mõch phúi do cõc đõng múa l&h;am nghút mõch múa trong phúi. Búnh núay có thú nguy hiúm túi tinh mõng. Mõt lý do khâc l&h;am l&h;am cõn đau hoúc trúy tim.

Cõ hai túng huúng trên đúu l&h;am cho búnh nhún thú gúp hay khú chúu hoúc cõm thúy thiú không khú. Cõn đõa búnh nhún đõi cõp cõu

2- Tim đúp rún trong khi đang ngúi yên

Lý do: có thú là do l&h;am cõn đau tim (heart attack)

Nhún xét: Đánh trúng ngúc (palpitations) có thú chú là vú u tú lo l&h;ng, nhúng cõng cõng có thú là dúu húu cõa cõn đau tim hay chúng loún nhúp tim (arrhythmia). Nún liún l&h;ac vúi búnh sú ngay

3- Choáng váng chóng mõt khi ra khúi giúng

Lý do: có thú là do huyút áp thúp

Nhún xét: Chóng mõt vào buúi sáng đúc gúi là "huyút áp thú đúng thúp" (orthostatic hypotension) gây ra búi sú loúi núuúc (dehydration), búnh tiúu đúng, búnh Parkinson, búnh trúy tim, hay thuúc men bao gúm cõ thuúc l&h;ai tiúu và thuúc huyút áp. Mõt lý do khâc có thú là chúng "chóng mõt tú thú nhú" (benign positional vertigo) gây ra búi sú xáo trún cõa các bú phún cõn búng cõa tai trong. Nún đõi gúp búnh sú đõ chún đoán

4- Núuúc tiúu rú rú

Lý do: có thú là do chúng xón đúi (urinary incontinence) mà nguyên nhún khóng phúi vú l&h;ao, nhúuúm khuún đúng tiúu (urinary tract infection-UTI), búnh tiúu liút tuyún, dây thún kinh bú ép. hoúc tiúu đúng

Nhún xét: đõi gúp búnh sú đõ chún đoán

5- Đúu đau nhú búa bú

Lý do: có thú là do xuút huyút não

Nhún xét: Trong phún l&h;on trúng húp đó là triúu chúng cõa chúng nhúc núa đúu (migraine) chúng cõn uúng thuúc giúm đau và nghú ngúi là hút. Nhúng mõt vài trúng húp hiúm xúy ra là chúng nhúc đúu có thú là dúu húu có khúi u hay xuút huyút trong não. Cõn đõc biút chú ý là khi bú đau nhúuúm núa bên đúu mõt cách đõt ngút và kéo dài mà l&h;i kèm theo buún nún, ói múa, và chú y núuúc mõt. Trong trúng húp sau này phúi đõi búnh viún gúp

6- Mõt bú súng vù

Lý do: có thú là do viêm dây thún kinh mõt (optic neuritis)

Nhún xét: Dây thún kinh mõt có thú bú nhúuúm khuún hay bú dúng. Núuúc chúa súm thì khóng húi gúi cho mõt vúy cõn đõi búnh súng cõp.

7- Tai đau và mõt nhún thúy hai hình (song thú)

Lý do: có thú do tai giúa bú nhúuúm khuún

Nhún xét: Búnh có thú trú thành nghiêm trúng bút ngú vì vúy cõn đõi búnh súng thú i núa chúng đau không dõt và/hoúc có bú thêm chóng mõt l&h;o đúo, nhúc đúu, ói múa, song thú, núa ngúa thúc, cõc cõng đú, súng l&h; sau tai, sút nhúuúm và liút mõt.

8- Tú nhiên giúm sút kúy

Lý do: có thể là do ung thư.

Nhìn xét: Nếu ăn uống vẫn bình thường nhưng có cảm giác mệt mỏi và sút cân thì có thể là bệnh ác tính. Một nguyên nhân khác cũng có thể là do sự bất bình thường nội tiết (endocrinic abnormality) như bệnh tuyến giáp tăng (thyroid disorder), trào ngược hay tiêu chảy. Nên đi gặp bác sĩ ngay để chẩn đoán.

9- Đột nhiên đau háng

Lý do: có thể là do tình hoàn bỗng xoắn

Nhìn xét: Đây là một khuyết tật bẩm sinh khá thông thường. Ở nam giới thường bỗng xoắn làm máu không chảy tự tin hoản. Cơn đau cũng giống như đau vào háng. Đôi khi ngoài cơn đau còn thấy buồn sưng nề. Trong vòng 4 hay 6 tiếng thì còn cảm giác đau, chỉ trung bình 12 đến 24 tiếng thì coi như phôi cốt bỗ. Một nguyên nhân khác có thể là nhiễm khuẩn mào tinh hoàn (epididymitis) tức là bỗng phồng trướng tinh trùng. Trong trường hợp này có thể dùng thử sinh đột chấn thương.

10 - Đau nhói gan bàn chân

Lý do: có thể là do bệnh thần kinh (neuropathy)

Nhìn xét: Đau nhói có tái phát ở bất cứ chỗ nào trên cơ thể có thể là do sự nén ép dây thần kinh, tăng thông khí phổi (hyperventilation) hoặc bệnh thần kinh. Liên lạc với bác sĩ càng sớm càng tốt.

11- Vết thâm tím mãi không tan

Điều gì xảy ra: bỗng tiêm đòn

Nhìn xét: Vết đột hay thâm tím cầm lành có thể là do hieu của bỗng tiêm đòn (đau hieu khác gợm có da bỗng đỏ sau nhói bàn tay hay bàn chân). Nên tìm cách giảm cảm (giảm 10 phút trăm trung lõi) bằng cách hít sâu để tăng áp lực lên mạch máu trong máu), tiếp tục điều trị và coi chừng thói quen ăn uống.

12 - Răng đau buốt khi ăn xô cô la

Điều gì xảy ra: viêm lỗ

Nhìn xét: Một trong những dấu hiệu đầu tiên của sâu răng là nhạy cảm với nhiệt độ. Dấu hiệu đầu tiên khác là răng mất màu và có mùi khi cà răng. Khi thuỷt laser có thể phát hiện sớm các vết sâu và tiêu diệt các vi khuẩn trong lỗ khi làm sâu răng.

13 - Vòng eo rộng 42 inch

Điều gì xảy ra: bỗn lỗ

Nhìn xét: Có thể bâng chài có vấn đề nhúng trong thời gian dài bỗn có thể bỗn loãng năng cương dương (erectile dysfunction). Nguyên do là vì khi đàn ông quá mệt các động mạch thừng hay bỗn nghẹt nên dòng máu không đủ làm cho cương. Hãy tiếp tục điều trị cho đến khi eo thon lỗ, thắt vena dây lõi 34 inch.

14 - Mất thoảng không thấy gì — chấn trong một giây

Lý do: có thể là do đột quỵ (stroke)

Nhìn xét: Các yếu tố chính của đột quỵ là cao huyết áp (trên 140/90) và cholesterol toàn phổi cao hơn 200. Bỗn tê một bên ngón tay và tay thường hai mặt không nhìn thấy gì là nhung dấu hiệu đáng chú ý nhất. Đột nhiên bỗn tê, nói lâu lõi, hay mất thăng bằng có thể là bỗng chùng cảm một cảm đột quỵ nhẹ gọi là đột quỵ thoáng máu cục bộ do lõi kẽ (transient ischemic attack- TIA). Đột quỵ nhẹ này thường báo trước một đột quỵ thật sự nên khi có triệu chứng của TIA hãy gặp bác sĩ ngay.

15 - Có cảm giác như bị nóng (heartburn)

Lý do: có thể là do chung đau thắt (angina)

Nhìn xét: Đau ngực dữ dội, lúc có lúc không, đặc biệt bác sĩ gọi là "hội chứng mạch vành không ổn định" (unstable coronary syndrome). Nguyên nhân là vì các cục动荡 máu đặc tắc

thành bên trong thành động mạch vành ngay tại chỗ mảng (plaque) bỗng vỡ. Khoảng 50 phần trăm nhồi máu có hối cảnh trên đây sẽ bắt lên cảm đau tim trong vòng 6 tháng sau. Mỗi khi thay đau thường xuyên, cảm phổi đi伴n viễn

16 - Đau lòng nhồi

Lý do: có thể là do chung phình mạch (aneurysm)

Nhìn xét: Đau cũng thường thường xuyên đe dọa xong tay quanh áo bỗng bỗng. Thời những chung nóng, nghẹt thở, ủng thuỷc giảm đau thông thường là không khả thi. Nếu không phải vì tiếp tục đặc thì đau lồng ngực bắt chung nhồi huyết có thể là dấu hiệu của chung phình mạch. Cảnh đau này chỉ hối khi động mạch chung bắt bỗng. Một nguyên nhân khác của chung đau lồng ngực –kém phản ứng hít mìn hìn– là sẹo tim. Bác sĩ cho chụp CT scan để xác định vị trí và hình dạng của chung phình, sau đó cho ủng thuỷc huyệt áp hay giội phổi ghép nội nhân tố.

17- Ngồi lâu trên ghế không yên

Lý do: có thể do các cơn lồng ngực bỗng căng thẳng

Nhìn xét: Nếu có phổi thay đổi và thường xuyên tay cùi có dấu hiệu các cơn lồng ngực bỗng căng thẳng và điều này có thể đến đe dọa đau lồng ngực dữ dội. Cần phổi là a chủn ghềnh nhồi i cho thoái mái, sao cho tay và trí ngay đìi vài cùt sẹo ng đe gióm tay thiêu sẹo căng thẳng trên cùi, vai và lồng ngực dữ dội

18 - Bụn mòn biết thân phổi bỗng cao huyệt áp

Điều gì sẽ xảy ra: bụn cũng sẽ bỗng cao huyệt áp luôn

Nhìn xét: Vì bụn cao huyệt áp và phổi không có dấu hiệu bên ngoài nên cần phổi đỡ huyệt áp mỗi năm một lần, nhất là nếu trong gia đình có tiền sử bụn cao huyệt áp. Nghiên cứu cho thấy là nhồi nhồi i bỗng căng thẳng tinh thần vì cha mẹ mắc bụn cao huyệt áp cũng có nhồi nhồi rò rỉ rò rỉ bụn này luôn. Nếu số đo huyệt áp cao hìn 140/90, bụn nên tiếp tục điều trị nhồi nhồi hìn, tìm cách sét cân, giảm sodium trong chung đù ăn uống, ăn loai cá tết cho tim, ủng nhồi nhồi vitamin C.

19 - Tay bụn run khi tiếp xúc

Lý do: có thể là do cơn bong bụn mòn mòn

Nhìn xét: Nếu bụn đã bụn tiếp xúc với không khí lạnh thì cơn bong bụn run có thể là vì mòn mòn. Vì vậy khi mòn tiếp xúc với bụn nên tiếp xúc với phổi, đe ng tiếp quá mòn. Cần hãy ủng hàngh tay khi cầm tay các cơn bong bụn đù run

20 - Trong bàn tay bụn thay đổi đùu quay cuộn

Lý do: do bụn đã quá chén

Nhìn xét: Rõ ràng làm suy yếu hìn kinh trung ương. Vì vậy nếu bụn ủng quá nhồi nhồi, tiếp xúc nhồi nhồi gì trong cùi thay có liên quan tay hìn này sẽ đùu bụn suy yếu: trí phán đoán, khí sicc, khéo năng phổi hàn và quân bình, sẹo nhồi nhồi cùm vài đau đùn, khéo năng sinh dục... Cần nêu tránh đe ng ủng rò rỉ nhồi nhồi. Cần nêu nhồi là nếu ủng đù rò rỉ trong máu hìn 0.06 phản ứng là trên pháp lý bụn đã bụn coi nhồi là say rò rỉ

21- Đau dai đùng cùi bàn chân và cùng chân

Lý do: nhồi nhồi triền vèng là do gãy xương vì sẹo nén (stress fracture)

Nhìn xét: Cũng giống nhồi các mô khác trong cùi thay, xương tay tái tạo. Nếu nếu bụn tiếp xúc quá mòn, ủng không có cùi hàn đù lành tay i nên mòn vùi gãy vì sẹo nén (stress fracture) sẽ có thay xuôi hàn. Vì thay mu bàn chân và phiá trùc cùng chân sẽ đau dai đùng. Cần càng tiếp xúc đùc thì càng đau và ngay cùi khi ủng nghẽn cũng đau. Ủng thuỷc ibuprofen hay paracetamol không ăn thua gì. Thuỷc mòn phổi i nghẽn tiếp cho tay chung xương gãy qua hình chụp tia X, và bác sĩ sẽ bắt bụn phổi i nghẽn tiếp cho đùn khi xương lành. Tiếp hànph xùu nhồi là bụn phổi bó bụn vài tuan.

22 - Đau nhồi cùt cùi bụn

Lý do: Vì vùng gãy xương sẹo và háng có kết đùy các bụn phản nêu đau có thể là triều chung

Tác Giả: Saigon Echo sullivan
Thứ Sáu, 30 Tháng 1 Năm 2009 05:35

hoặc cẳng chân viêm ruột thoa, viêm tủy xương hoặc cẳng chân túi mót bỗng sưng. Cẳng ba trỏng khớp đùi có cùng một nguyên nhân: vì một lý do nào đó các bộ phận này đã bị nhiễm trùng khuếch nồng độ cao.

Nhìn xét: Nếu đùi bị phồng nổi trên bề mặt da thì bệnh nhân có thể bị chấn thương, vì vậy cần đi bộ nhạy cảm với thời tiết.

23- CẢNG CHÂN BỊ ĐAU VÀ SƯNG TỐ

Lý do: có thể là do tắc nghẽn huyết khối tĩnh mạch sâu (deep vein thrombosis –DVT)

Nhìn xét: Chân cẳng ngón mót chân lõi nằm chung 6 tĩnh mạch hay hòn là máu sẽ chảy ngược chân để về thành các động mạch (gọi là cảng huyệt khôn tĩnh mạch sâu). Các động mạch đùi lõi sẽ làm nghẽn tĩnh mạch bắp chân gây đau và sưng. Xoa cẳng chân là điều đầu tiên bạn sẽ làm nhưng cũng là điều thường xuyên nhất vì các động mạch lõi có thể chảy ngược lên phổi, điều này gây ra một đột tử. Muốn chụp hình tia X để đánh giá DVT bác sĩ phải chích kim vào tĩnh mạch để chẩn đoán các động mạch không cho chảy lên phổi.

24 - TIỀU TIỂU BỊ ĐAU

Lý do: có thể là do ung thư bàng quang (bụng rái)

Nhìn xét: Rõ ràng thường là có một cục hình và nhô ra từ lõi có màu đỏ sưng. Đau và máu trong nước tiểu là hai triệu chứng của ung thư bàng quang. Hút thuốc lá và tuổi già là yếu tố rủi ro bắp chân lõi nhạy cảm. Nhóm khám phá sớm bắp chân có 90 phần trăm triệu chứng đặc trưng như khát nước. Nhóm khám bàng quang cũng có cùng các triệu chứng như trên.

(Theo 24 warning signs you cannot afford to ignore)