

Gout can be cured by drink Black or Blue Cherry Juice

Cách đây không lâu, ghi hứa thăm sicc khéo cưa mứt ngọt i bùn thận đang cung cấp SJ, tôi đã có biết bùn mình đang bị đau khớp vì bệnh GOUT hành-hứa

Bên tôi cho biết rằng nếu người khi lợn tuồi thùng hay mặc bùn này và họ cần n้ำ là hiện nay DỐNG NHỎ chia có cách điều trị cho tuyệt bùn mà chỉ có cách tiếp tục ... UỐNG THUỐC.

Bên còn cho biết thêm rằng nếu chịu khó xem nào đau quá thì đến phòng mạch BS đó để chích vào chỗ đó 1 mũi thuốc khá đột tiêm, và tuy dù có Medicare, bên vẫn phải trả \$100 Co-Pay cho một mũi chích mà thuốc chỉ có công hiệu giảm đau trong khoảng 1 hai tuần.

Nhưng có điều may mắn là tôi SJ nói bùn tôi đang cung cấp có một MD gốc Trung-Hoa không lạm dụng Co-Pay nên vẫn BS này rất đồng ý chia sẻ với Việt.

Nghe thấy căn bệnh này tôi khá lâu, nhưng đến nay mới có dịp tìm hiểu thêm và xin giới thiệu các bạn những tài liệu tham khảo dưới đây đó TÙY NGHĨ áp-dụng theo trí phán xét của mỗi cá nhân.

Khi hèn này KHÔNG có dũng-ý nào khác ngoài mặc đích mứt thay lợi thăm hứa thận-tình bùn nhung lợi GÓP Y ĐỒ Bên và những người đang đau khớp vì bệnh GOUT có thể tự n-đóng độc-tính để biết cách BLUE CHERRY JUICE để uống thay thế cho những giải khát mà lợi có công hiệu giảm trung nhung đau đớn của bệnh GOUT.

Trước hết chúng ta hãy tìm hiểu nguyên-nhân, nguồn bùn, biến chung, phòng ngừa và cách điều trị đang độc-ap-dụng từ trước tay nay.

Cuối cùng là cách CHỮA BÙN GOUT KHÔNG CẦN DÙNG THUỐC trong mứt sicc (6) bên dưới

1. Nguyên nhân của bệnh Gout:

Bệnh này do nồng độ ACID URIC trong máu tăng quá cao.

Acid uric là một sản phẩm phả o ra do sự thoái giáng của purin.

Purin cũng có trong tất cả các loài thịt, cá và gia cầm.

Chia Bénh Gout Không Cần Dùng Thuốc

Tác Giả: Lão-Ngô u NKĐ

Thứ Năm, 19 Tháng 3 Năm 2009 00:45

Thông thường thì acid uric bã phán hõ y trong máu và đõ c thõ i ra ngoài qua thận đõ ra nõ c tiõ u. Nhõ ng đôi khi cõ thõ bñ n tõ o ra quá nhiõ u acid uric hoõ c thõ i acid này ra nõ c tiõ u quá ít. Hõ u quõ là acid uric trong máu tăng lên, tích lũy dñ n dñ n và lõ ng đõ ng thành nhõ ng tinh thõ sõ c nhõ n hình kim tõ i các khõ p hoõ c các bao quanh khõ p gây ra triõ u chõ ng đau đõ n, viêm sõ ng khõ p.

Mõt sõ tinh trõ ng khác, gõ i là giõ Gout, cũng làm lõ ng đõ ng tinh thõ i khõ p nhõ ng không phõ i tinh thõ acid uric mà là tinh thõ calcium pyrophosphate dihydrate.

Bénh giõ Gout cũng có thõ gây đau khõ p ngón chân cái tõ òng tõ Gout nhõ ng thõ òng thì i các khõ p lõ n hõ n nhõ gõ i, cõ tay hoõ c mõt cá chân.

2. Nguồn bñ nh

Nhõ ng hoàn cõ nh và lý do sau đây có thõ làm tăng acid uric máu cũng nhõ tăng nguy cõ bñ nh Gout:

- Đa sõ lý do là vì đã uõng nhiõ u Rõ õ u, đõ c biõt là rõ õ u ... BIA.
- Mõt sõ bñ nh và vài thõ thuõc dùng đõ đõ u trõ các bñ nh khác cũng có thõ làm bñ n tăng nguy cõ bñ Gout, nhõ tăng huyõt áp, Diabetes, High Chlorestrol và ngay cõ ít vñ n đõ ng,... cũng làm tăng acid uric.
- Mõt vài loõi thuõc nhõ thiazide, aspirin liõ u thõ p và cyclosporine ...
- Mõt phõn tõ (25%) sõ bñ nh nhân bñ Gout là do di-tuyõn.
- Nam giõ i thõ òng thõ y mõc bñ nh Gout nhiõ u hõ n nõ giõ i.

3. Biñ n chõ ng

Mõt sõ bñ nh nhân bñ Gout tiõ n triõ n đõ n viêm khõ p mõn tính, thõ òng có sõ thay đõ i màu do lõ ng đõ ng các tinh thõ dõ õ i da cõ i là sõn urat (tophi). Mõt sõ ít có thõ bñ sõ i thõ n.

4. Điều trị

- Thuõc kháng viêm không có Steroid (NSAIDs) dùng làm giõ m đau nhõ Indomethacin (Indocin) hoõ c các thuõc bán tõ do i nhà thuõc nhõ Ibuprofen (Advil, Motrin,...).

- Bác sĩ cũng có thõ kê toa cho bñ n các kháng viêm có Steroid nhõ prednisone Tuy nhiên hãy cõn thõ n vñ i các thuõc này và tham vñ n ý kiõn bác sĩ cõ a bñ n vñ cách dùng và thõ i gian dùng (thõ òng chõ nêng dùng tõ 3-10 ngày), vì nõ u đõ u trõ kéo dài chúng có thõ gây các biñ n chõ ng nhõ viêm loét và xuõt huyõt dõ dàt tá tràng.

- Trõ òng hõ p bñ n bñ cõn Gout nõ ng, bác sĩ có thõ cho bñ n dùng Colchicin hoõ c chích Cortisone thõ ng vào khõ p (nhõ đã giõ i thiõ u vñ mõt MD gõ c TH tõ i SJ trong phõn mõ đõ u).

5. Phòng ngừa

Hiõn chõ a có cách nào chõ c chõ n đõ ngăn ngõ a sõ khõ i phát và tái phát cõ a các cõn Gout. Nõ u bñ n bñ Gout, bác sĩ cõ a bñ n sõ cho bñ n dùng mõt sõ thuõc giúp ngăn ngõ a hoõ c làm giõ m thiõ u đõ nõ ng cõ a các cõn tái phát sau này.

Các thuõc này gõ m có Allopurinol (Zyloprim, Alopurinol) và Probenecid (Benemid) dùng hàng ngày giúp giõ m nõ ng đõ và tõ c đõ sõn xuõt acid uric. Vìõ c duy trì nõ ng đõ acid uric lõn đõ nh lõ

Chia Bénh Gout Không Cần Dùng Thuốc

Tác Giả; Lão-Ngô u NKĐ

Thứ Năm, 19 Tháng 3 Năm 2009 00:45

giỏi hòn bình thường là cách ngăn ngừa bệnh Gout lâu dài và hiệu quả nhất.

6. CHIA BÉNH GOUT KHÔNG CẦN DÙNG THUỐC:

Có khá nhiều tài liệu chứng minh về Dược tính của Black Cherry có khả năng làm giảm thiểu sự đau đớn vì các bệnh đau khớp xương và đặc biệt là bệnh GOUT.

Xin giới thiệu một tài liệu tiêu-bí u, rõ ràng và dễ hiểu hơn cùa :

Mở i Click ==> <http://coachlevi.com/health/relieve-joint-pain-with-black-cherry-juice/>

Nhiều người cho biết rằng KHÓ có thể tìm mua Black Cherry Juice. Nhưng chính tôi đã tìm và thấy ở những chai nhỏ 8 oz Concentrate Black Cherry , đặc biệt bán trong những Grocery Stores (như Fred Meyers, Safeway) với giá \$3.99/ea.

Bên có thể mua một vài chai đem về pha nồng độ 16 oz thì có thể tiêm trực tiếp mua Online với giá rẻ hơn với giá \$5.53 một chai 16 oz .

(Nếu mua trên \$65 thì không phải trả tiền Shipping cost.)

Click vào đây để mua Online 16oz Bottle ==> <http://www.iherb.com/Search.aspx?kw=black%20cherry>

CÁCH ỦNG:

- Pha 1 phần Black Cherry Concentrate đó với 5 phần nước.

- Hãy uống nhau một lượng nhỏ nước giải khát thông thường (Coke, Soda ...) Thân chúc quý bạn khỏe vì GOUT không một cách chữa trị ít tốn kém.